

KARTA WIZYTY STOMATOLOGICZNEJ PACJENTA



Imię i nazwisko



Data wizyty

Wykonane procedury:

- Badanie lekarskie co 6 miesięcy z przeglądem próchnicy zębów i monitorowaniem stanu uzębienia
- Usuwanie złogów nazębnych np. kamienia nazębnego, osadów
- Płukanie kieszonki dziąstowej i aplikacja leku
- Leczenie zmian na błonie śluzowej jamy ustnej
- Badanie żywości zębów
- Zabezpieczenie profilaktyczne bruzd lakiem szczelinowym
- Lakierowanie zębów
- Leczenie próchnicy powierzchniowej
- Inne: _____

Pieczęć / gabinet

Refundacja

NFZ

Narodowy Fundusz Zdrowia

Informacje dodatkowe:



ZASADY PROFILAKTYKI



To od Ciebie zależy czy Twoje dziecko uniknie próchnicy - zadbaj o jego systematyczną profilaktykę!

Profilaktyka stomatologiczna, to inaczej zapobieganie próchnicy i dążenie do utrzymania zdrowych zębów u młodych pacjentów. Należy nauczyć dziecko codziennego mycia zębów: szczoteczką i pastą z fluorem, 2-3 razy dziennie; najlepiej po każdym posiłku. Ważne jest również wprowadzenie stosowania nici.



Wyjaśniamy najważniejsze pojęcia

Badanie lekarskie kontrolne - oceniające kondycję zębów dziecka. Sprawdzenie czy zęby rosną prawidłowo, czy jest próchnica oraz czy zęby są prawidłowo czyszczone.

Usunięcie złogów nazębnych ze wszystkich zębów - wykonywane za pomocą szczoteczki oraz skalera, który usuwa kamień poprzez ultradźwięki. W przypadku wrażliwych zębów stosujemy znieczulenie powierzchniowe polegające na aplikacji preparatu z lidokainą.

Lakierowanie zębów - pokrycie zębów lakierem z fluorem. Zabieg ten ma na celu wzmocnienie szkliwa i powoduje, że zęby są mniej podatne na próchnicę. Lakierowanie zębów u dzieci proponujemy wykonywać co 3 miesiące.

Lakowanie - uszczelnianie bruzd specjalnym, światłoutwardzalnym preparatem zwanym lakiem. Lakowanie zęba powinno się wykonać maksymalnie do kilku miesięcy od pojawienia się zęba stałego bocznego: trzonowca lub przedtrzonowca w jamie ustnej. Zabieg ten zapobiega powstawaniu próchnicy.

Leczenie próchnicy powierzchniowej - na zębach występują białe plamki, jest to już pierwszy etap uszkodzenia szkliwa zęba. W tym przypadku stosujemy preparat w postaci żelu - wykonywane szczoteczką z pastą GC Tooth Mousse.

Płukanie kieszonek dziąsłowych i aplikacja leku - głównym celem leczenia jest działanie przeciwbakteryjne. Stosujemy w tym celu strzykawkę z roztworem H₂O₂ 3% (woda utleniona).



Dziękujemy za wizytę!